

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS (EQUIPOS DE PROTECCION)

ATENCIÓN PRIMARIA

FORMAS FARMACEUTICAS PARENTERALES

NIOSH	Preparación	Administración	Residuos	Listado Medicamentos
MP Riesgo 1 y Riesgo 2	Si no viene preparado el medicamento utilizar guantes de nitrilo, bata verde, mascarilla FFP3 y gafas de protección sobre un paño absorbente. 	Administrar siempre con guantes de nitrilo Utilizar bata verde si no se dispone de sistema cerrado de administración.  Utilizar protección ocular (gafas) y respiratoria (FFP3) cuando exista riesgo de salpicadura y posibilidad de inhalación 	Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación al CONTENEDOR AZUL 	RIESGO 1: Goserelina (Zodalex) Jeringa precargada; Leuprorelina/Leuprolida (Eligard) Jeringa precargada+jeringa disolvente; Metotrexato Jeringa precargada; Triptorelina (Gonapeptyl,Decapeptyl) (vial + disolvente) RIESGO 2: Fenitoina ampolla; Liraglutida (Viztoza) Pluma precargada;
MP Riesgo 3	NO SE PRECISA PROTECCIÓN salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso se debe hacer con guantes de nitrilo, bata verde, gafas de protección y mascarilla FFP3, sobre un paño absorbente. 	NO SE PRECISA PROTECCIÓN salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en ese caso se seguirán las mismas indicaciones de Administración de los grupos de Riesgo 1 y 2	El material corto-punzante  Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación a la BOLSA VERDE 	RIESGO 3: Ácido Valproico Vial; Gonadotrofina Coriónica Humana (Ovitrelle) Pluma precargada; Testosterona Ampolla

ATENCIÓN PRIMARIA

FORMAS FARMACEUTICAS ORALES SOLIDAS

NIOSH	Preparación	Administración	RESIDUOS	LISTADO
MP Riesgo 3	NO SE PRECISA PREPARACIÓN	NO SE PRECISA PROTECCIÓN salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en ese caso: Administrar con guantes de nitrilo 	Envases, material para la preparación y para la administración y restos de medicación a la BOLSA VERDE 	RIESGO 3: Colchicina

Para la administración de **Cloranfenicol (riesgo 2)** en colirio y pomada utilizar guantes de nitrilo

