

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS CASOS DE MPOX EN ESPAÑA, 2026

Datos extraídos de SiViES el 05/10/2026 a las 08:00h

Desde el inicio de brote en abril de 2022 hasta el 5 de octubre de 2026 se han notificado un total de 10.535 casos confirmados de mpox (tabla 1).

Tabla 1. Número de casos confirmados de mpox e incidencia por 100.000 habitantes, 2022-2026

Año	Nº (%)	Incidencia por 100.000 habitantes
2022	7.522 (71,4)	15,84
2023	325 (3,1)	0,68
2024	694 (6,6)	1,43
2025	875 (8,3)	1,78
2026	1.119 (10,6)	2,23
Total	10.535 (100)	

La distribución de casos por Comunidad y Ciudades Autónomas se muestra en la tabla 2. En el periodo 2022-2026 todas han notificado casos excepto Melilla.

Tabla 2. Nº de casos confirmados de mpox declarados en SiViES según año y CCAA de notificación, 2022-2026

CCAA	Total casos Nº (%)	Casos 2022 Nº (%)	Casos 2023 Nº (%)	Casos 2024 Nº (%)	Casos 2025 Nº (%)	Casos 2026 Nº (%)
Andalucía	1.274 (12,1)	884 (11,8)	37 (11,4)	110 (15,8)	55 (6,3)	188 (16,8)
Aragón	128 (1,2)	74 (1,0)	5 (1,5)	0	7 (0,8)	42 (3,8)
Asturias	69 (0,7)	59 (0,8)	2 (0,6)	0	4 (0,5)	4 (0,4)
Baleares	278 (2,6)	216 (2,9)	15 (4,6)	16 (2,3)	15 (1,7)	16 (1,4)
Canarias	231 (2,2)	176 (2,3)	0	7 (1,0)	18 (2,0)	30 (2,7)
Cantabria	42 (0,4)	36 (0,5)	0	2 (0,3)	1 (0,1)	3 (0,3)
Castilla La Mancha	103 (1,0)	66 (0,9)	3 (0,9)	14 (2,0)	12 (1,4)	8 (0,7)
Castilla y León	102 (1,0)	85 (1,1)	3 (0,9)	4 (0,6)	4 (0,5)	6 (0,5)
Cataluña	3.146 (29,9)	2.330 (31,0)	103 (31,7)	270 (38,8)	262 (29,9)	181 (16,2)
Ceuta	1 (0,01)	0	0	0	0	1 (0,1)
Extremadura	55 (0,5)	32 (0,4)	1 (0,3)	1 (0,1)	0	21 (1,9)
Galicia	158 (1,5)	122 (1,6)	2 (0,6)	6 (0,9)	7 (0,8)	21 (1,9)
Madrid	3.710 (35,2)	2.534 (33,8)	117 (36,0)	223 (32,2)	392 (44,8)	444 (39,7)
Murcia	118 (1,1)	89 (1,2)	10 (3,1)	7 (1,0)	4 (0,5)	8 (0,7)
Navarra	25 (0,2)	21 (0,3)	0	2 (0,3)	0	2 (0,2)
País Vasco	290 (2,8)	245 (3,3)	1 (0,3)	13 (1,9)	8 (0,9)	23 (2,1)
La Rioja	13 (0,1)	6 (0,1)	0	0	6 (0,7)	1 (0,1)
C. Valenciana	792 (7,5)	547 (7,3)	26 (8,0)	19 (2,7)	80 (9,1)	120 (10,7)
Total	10.535	7.522	325	694	875	1.119

Para información más detallada del periodo 2022-2025, se puede consultar el siguiente link:
<https://cne.isciii.es/documents/d/cne/situacion-epidemiologica-de-los-casos-de-mpox-2022-2025>

A continuación, se describen las características de los casos notificados en 2025 y 2026.

1. Características de los casos

Las características de los casos por año se muestran en la tabla 3. En el año 2026 la mayor parte fueron hombres (96,8%), al igual que en 2025.

La edad osciló entre 1 y 79 años en 2026 (1-80 años en 2025), con una mediana de edad de 37 años (rango intercuartílico (RIC): 31-45 años); en 2025, la mediana de edad fue de 35 años (RIC: 29-43 años). El 66,7% de los casos tenía entre 30 y 49 años, similar al año previo.

En 2026, el 35,1% (393 casos) habían nacido en España y el 33,2% en países de Latinoamérica. El porcentaje de casos nacidos en España en 2026 es superior al notificado en 2025 (31,4%).

Tabla 3. Características demográficas de los casos de mpox declarados en SiViES, 2025-2026

Características demográficas	2025	2026
	Nº (%)	Nº (%)
Sexo		
Hombre	841 (96,1)	1.083 (96,8)
Mujer	34 (3,9)	35 (3,1)
No consta	0 (0,0)	1 (0,1)
Grupos de edad		
Menor de 20	9 (1,0)	12 (1,1)
20-29	211 (24,1)	209 (18,7)
30-39	364 (41,6)	458 (40,9)
40-49	194 (22,2)	289 (25,8)
50-59	79 (9,0)	120 (10,7)
60 y más	16 (1,8)	28 (2,5)
No consta	2 (0,2)	3 (0,3)
Región de nacimiento		
España	275 (31,4)	393 (35,1)
Europa Occidental	31 (3,5)	46 (4,1)
Europa Central – Este	13 (1,5)	17 (1,5)
Latinoamérica	300 (34,3)	372 (33,2)
África del Norte y Oriente Próximo	14 (1,6)	21 (1,9)
África Subsahariana	4 (0,5)	7 (0,6)
Otros	10 (1,1)	12 (1,1)
Desconocido	228 (26,1)	251 (22,4)
Total	875 (100)	1.119 (100)


2. Características de la enfermedad

De los 1.994 casos notificados desde el 1 de enero de 2025 hasta el cierre de este informe, 1.909 (95,7%) disponen de fecha de inicio de síntomas.

La distribución de los casos por mes de inicio de síntomas se muestra en la figura 1.

En 2026 la mediana en días entre la fecha de inicio del primer síntoma y la fecha de confirmación por laboratorio fue de 7 días (RIC [4-10]), igual que en 2025. Respecto a la diferencia entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de declaración a nivel de CCAA fue de 9 días en 2026 (RIC [6-12]) en 2026 y de 4 días en 2025 (RIC [0-10]).

Figura 1. Curva epidémica de casos confirmados según mes y año de inicio de síntomas, 2022-2026



Los 107 casos con fecha de inicio de síntomas en septiembre de 2026 han sido notificados por Madrid (54 casos), Andalucía (21 casos), Cataluña (16 casos), Comunidad Valenciana (7 casos), Canarias (3 casos), Asturias (1 caso), Baleares (1 caso), Castilla La Mancha (1 caso), Ceuta (1 caso), Extremadura (1 caso) y Navarra (1 caso).

a) Aspectos clínicos

Las características clínicas de los casos por año se muestran en la tabla 4. En el año 2026 un total de 837 casos (74,8%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea). La fiebre fue el síntoma general más frecuente (657 casos, 58,7%). Un total de 422 casos (37,7%) presentaron linfadenopatías localizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en 687 casos (61,4%), en la zona oral-bucal en 219 casos (19,6%) y en 573 (51,2%) en otras localizaciones (figura 2).

Un 13,0% del total de casos presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico, con un aumento en el porcentaje respecto a 2025 (8,8%). De ellas, las más frecuentes en 2026 han sido las úlceras bucales (31,7%) y la infección bacteriana secundaria (27,6%).

En 2026 se han notificado 127 hospitalizaciones (11,4%). La mayoría fueron hombres (120 casos, 94,5%), con una mediana de edad de 34 años (RIC [30-46]). En 2025 todos fueron hombres, con una mediana de edad de 33,5 años (RIC [28-40,5]). En los casos hospitalizados en 2026 en los que la fecha de ingreso y de alta estaba disponible, la estancia mediana en el hospital fue de 6 días (RIC [3-9]); en 2025, la estancia mediana fue de 5 días (RIC [2-7]).

Tabla 4. Características clínicas de los casos de mpox según año, 2025-2026


Aspectos clínicos	2025 Nº (%)	2026 Nº (%)
Presencia de manifestaciones clínicas*		
Síntomas generales:		
Fiebre	541 (61,8)	837 (74,8)
Astenia	403 (46,1)	657 (58,7)
Dolor de garganta	243 (27,8)	397 (35,5)
Dolor muscular	170 (19,4)	363 (32,4)
Cefalea	162 (18,5)	261 (23,3)
Linfadenopatías:		
Localizadas	147 (16,8)	283 (25,3)
Generalizadas	333 (38,1)	422 (37,7)
Exantema:		
Anogenital	49 (5,6)	50 (4,5)
Oro-bucal	635 (72,6)	687 (61,4)
Otras localizaciones	114 (13,0)	219 (19,6)
Complicaciones	388 (44,3)	573 (51,2)
Tipo de complicaciones**		
Infección bacteriana secundaria	77 (8,8)	145 (13,0)
Úlcera bucal	35 (45,5)	40 (27,6)
Infección corneal	25 (32,5)	46 (31,7)
Sepsis	3 (3,9)	11 (7,6)
Proctitis	1 (1,3)	1 (0,7)
Miocarditis/miopericarditis	2 (2,6)	4 (2,8)
Hospitalización	1 (1,3)	0 (0,0)
Hospitalización en UCI	52 (5,9)	127 (11,4)
	2 (0,2)	2 (0,2)

*Un paciente puede presentar más de una manifestación clínica. Los porcentajes están calculados sobre el total de casos en cada año.

**Porcentajes calculados sobre el total de casos con complicaciones

En 2026 se notificó un caso de mpox clado II en un hombre, entre 50 y 60 años, que requirió ingreso en la UCI debido a una sepsis y que finalmente falleció en el primer trimestre del año. Esta persona presentaba infección por el VIH en estadio avanzado de inmunosupresión. No había sido vacunado frente a mpox. En el segundo trimestre se ha notificado el fallecimiento de otro hombre, entre 30 y 39 años, que presentaba infección por VIH en avanzado estado de inmunosupresión. No se disponía de información sobre su estado vacunal.

Figura 2. Manifestaciones clínicas de los casos de mpox, 2025-2026



b) Antecedentes personales

Un total de 338 casos de mpox (35,6% de los 949 casos con información) presentaron coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 2026, porcentaje inferior al del año 2025 (tabla 5).

Respecto a la vacunación en 2026, 931 casos (83,2%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, sin variación respecto al año previo (tabla 5). De los 173 casos vacunados en 2026, 34 (19,7%) habían recibido solo una dosis, 102 (59,0%) dos dosis y en 37 casos (21,4%) no constaba esta información. En 2025, el 63,6% de los casos vacunados (63 casos) había recibido dos dosis, 30,3% una sola dosis (30 casos) y en 6 casos (6,1%) no se disponía de información.

Tabla 5. Antecedentes personales de los casos de mpox según año, 2025-2026

Antecedentes personales	2025 Nº (%)	2026 Nº (%)
Coinfección con el VIH *	279 (47,6)	338 (35,6)
Estado vacunal		
Vacunado frente a mpox	99 (11,3)	173 (15,5)
Vacunado solo frente a viruela	19 (2,2)	15 (1,3)
No vacunado/desconocido	757 (86,5)	931 (83,2)

* Porcentajes calculados sobre el total de casos con información en esa variable

c) Datos de laboratorio


En 2026, los casos fueron confirmados por PCR realizada en muestras de lesiones cutáneas (564 casos), líquido vesicular (262 casos), 98 casos en otras muestras y en 195 se desconoce esa información (tabla 6).

Tabla 6. Tipo de muestra de los casos de mpox según año, 2025-2026

Tipo de muestra	2025 Nº (%)	2026 Nº (%)
Lesión cutánea	551 (63,0)	564 (50,4)
Líquido vesicular	176 (20,1)	262 (23,4)
Otra muestra	92 (10,5)	98 (8,8)
No consta información	56 (6,4)	195 (17,4)
Total	875 (100)	1.119 (100)

Desde agosto de 2024 se recoge información sobre el clado. El porcentaje de casos por tipo de clado calculado sobre el total de casos según mes de inicio de síntomas o de diagnóstico se muestra en la figura 3.

Figura 3. Porcentaje de casos por tipo de clado sobre el total de casos según mes, 2025-2026



El primer caso de clado Ib se identificó en España en septiembre de 2025 en un caso importado de Tanzania y en octubre de 2025 se comunicó el primer caso de clado Ib de transmisión comunitaria en España. En 2025 se han notificado 61 casos de clado I/Ib (7% del total de casos) y en 2026, 681 casos (60,9%) (tabla 7).

Tabla 7. Distribución de los casos de mpox según clado y subclado, 2025-2026

Clado	Enero-diciembre 2025	Enero-octubre 2026
Clado I	23	487
Clado Ib	38	194
Clado II	565	157
Clado IIa	1	0
Clado IIb	6	5
No consta información	242	276
Total	875	1.119

3. Características de la exposición

El 13,1% de casos reportaron un contacto estrecho con un caso probable o confirmado en 2026. Un 7,1% refirieron antecedente de viaje en los 21 días previos a la fecha de inicio de síntomas (9% en 2025). Un total de 40 casos (3,6%) fueron clasificados como casos importados (porcentaje superior respecto a 2025) (tabla 8).

Tabla 8. Características de la exposición de los casos de mpox según año, 2025-2026

Exposición	2025 Nº (%)	2026 Nº (%)
Contacto estrecho con un caso		
Sí	119 (13,6)	147 (13,1)
No/No consta	756 (86,4)	972 (86,9)
Antecedente de viaje (21 días previos a FIS)		
Sí	79 (9,0)	79 (7,1)
No/No consta	796 (91,0)	1040 (92,9)
Importado		
Sí	23 (2,6)	40 (3,6)
No/No consta	852 (97,4)	1079 (96,4)
Total	875 (100)	1.119 (100)

*FIS: fecha de inicio de síntomas

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual (78,2%), porcentaje inferior a 2025 (83,3%). En 2026, se ha notificado un caso de transmisión ocupacional en el ámbito sanitario. El porcentaje de casos sin información sobre el modo de transmisión es mayor en 2026 (tabla 9).

Tabla 9. Mecanismo de transmisión de los casos de mpox según año, 2025-2026

Mecanismo de transmisión	2025 Nº (%)	2026 Nº (%)
Contacto estrecho sexual	729 (83,3)	875 (78,2)
Contacto estrecho no sexual	21 (2,4)	36 (3,2)
Otro	1 (0,1)	6 (0,5)
No consta información	124 (14,2)	202 (18,1)
Total	875 (100)	1.119 (100)

Respecto a la orientación sexual de los casos, excluyendo los menores de 14 años, la mayor parte eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres (tabla 10).

Tabla 10. Orientación sexual de los casos de mpox según año, 2025-2026

Orientación sexual	2025 Nº (%)	2026 Nº (%)
Hombres que tiene sexo con hombres	693 (79,4)	888 (79,5)
Hombre heterosexual	40 (4,6)	44 (3,9)
Mujer heterosexual	24 (2,7)	22 (2,0)
Mujer bisexual	1 (0,1)	0 (0,0)
No consta información	115 (13,2)	163 (14,6)
Total	873 (100)	1.117 (100)

4. Conclusiones:

- Se continúan notificando casos de mpox en España, observándose un aumento de casos en el mes de julio y agosto.
- No se han detectado cambios significativos en las características clínicas y epidemiológicas de los casos identificados en 2025 y 2026.