

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE LA RIOJA

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA Y LA INFECCIÓN POR VIH. LA RIOJA 1986-2013

Carmen Quiñones Rubio, Eva Martínez Ochoa. Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria. Gobierno de La Rioja.

Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2014; 6 (5): 87-109

ÍNDICE

1. Vigilancia epidemiológica del SIDA y la infección por VIH. La Rioja 1986-2013
2. Comentario epidemiológico
3. Defunciones en La Rioja según grupo de causa, sexo y edad.
4. Estado de las enfermedades de declaración obligatoria.
 - 4.1. Situación general.
 - 4.2. Distribución por zonas de Salud.

INTRODUCCIÓN

La epidemia de la infección por VIH hizo necesario disponer de una información epidemiológica de forma sistemática sobre nuevos diagnósticos de VIH y de Sida que permitieran planificar respuestas. Para ello, en España se pusieron en marcha los registros de infección por VIH y de Sida.

El sistema de información VIH (SINIVIH) cubre el 71% de la población española y recoge información sobre todos los nuevos diagnósticos de la infección. Es la forma más aproximada de conocer la incidencia de VIH ya que al ser una infección asintomática, los registros incluyen tanto las infecciones recientes como las que se produjeron años atrás y que son diagnosticadas posteriormente. Este registro está previsto que cubra el 100% de la población española.

El Registro Nacional de Sida se puso en marcha al inicio de la epidemia, recoge información sobre los nuevos diagnósticos así como la evolución de los casos diagnosticados con anterioridad y está implantado en toda España. Al proporcionar información sobre la infección avanzada por VIH, sus datos son muy útiles para evaluar la efectividad de la terapia antirretroviral de alta eficacia (TARGA)¹.

El objetivo de este informe es presentar la situación y evolución temporal del VIH-Sida en La Rioja, describir las características epidemiológicas de los nuevos casos diagnosticados durante el año 2013, así como contribuir a la vigilancia epidemiológica de la infección y enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos del Registro de VIH/Sida de La Rioja proceden del Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) en el caso del Sida y por búsqueda activa en el caso del VIH. Se utiliza la definición europea de Sida ².

La información se completa a partir de los siguientes servicios o registros:

- Laboratorios de microbiología de La Rioja
- Registro de altas hospitalarias
- Registro de atención primaria
- Registro de mortalidad
- Registro de tuberculosis en La Rioja
- Otros servicios

Para el cálculo de las tasas se han empleado como denominadores los datos del padrón continuo de población de La Rioja, relativos a los años 1996 a 2013. Para el cálculo de tasas de los años 1984 a 1995, se han utilizado las proyecciones de población calculadas a partir del censo de 2001 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (www.ine.es). Para el cálculo de las tasas de los años 1996 a 2013, relativas a los nacidos en España y fuera de España, se han empleado como denominadores los datos del padrón continuo de nacidos fuera de España residentes en La Rioja según país de nacimiento proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).


Los datos relativos a la mortalidad se actualizan a través del Registro de Mortalidad de La Rioja y el Índice Nacional de Defunciones. Para analizar la tendencia de las tasas, se han empleado modelos de regresión de joinpoint que detectan los cambios en las tendencias de la serie estudiada.

RESULTADOS

En La Rioja durante el periodo comprendido entre el año 1986 momento en el que se notificó el primer caso y el 31 de diciembre de 2013 se han registrado 553 casos de Sida.


En la figura 1 se presenta la distribución temporal de las tasas de Sida por año de diagnóstico en La Rioja, donde se observa la evolución de las tasas (por 100.000 habitantes) con dos cambios en la tendencia. Un primer periodo desde el año 1986 hasta 1994 en el que la tendencia crece con un promedio del 26,6% anual y un segundo periodo del año 1994 al 2012 donde las tasas disminuyen con un promedio del 11,9% anual. Ambos cambios son estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Figura1.- Tendencia y distribución temporal de tasas de Sida por año de diagnóstico. La Rioja 1986-2013.



Para el conjunto del periodo, el 79,7% de los casos son varones y un 20,3% son mujeres. En la figura 2 vemos la incidencia de Sida por año de diagnóstico y su distribución por sexo en La Rioja, durante los años 1986 a 2013, donde se aprecia la masculinización de la enfermedad.


Figura 2.- Tasas de incidencia de Sida por sexo y por año de diagnóstico. La Rioja 1986-2013.



Del total de casos de Sida un 49,4% tenía en el momento del diagnóstico una edad comprendida entre 30 y 39 años, el 25,7% entre 20 y 29 años lo que indica que en el 75% de los casos la edad al diagnóstico está comprendida entre los 20 y 39 años.

Conforme aumenta la edad el porcentaje de casos de Sida disminuye, correspondiendo el 12,8%, a los que tienen una edad comprendida entre 40 y 49 años y el 10,3% a los mayores 49 años. Los menores de 13 años de edad al diagnóstico (casos pediátricos) suponen el 1,6% de los casos (Figura 3).


Figura 3.- Distribución de casos de Sida por años y grupos de edad al diagnóstico. La Rioja 1986-2013



Categoría de transmisión

El mayor porcentaje de personas contrajo la infección debido al hecho de compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas (UDVP) que supone el 62,2%. En segundo lugar un 32,4% de los casos corresponden a las personas que contrajeron la infección por relaciones sexuales no protegidas (heterosexuales y homosexuales). De las que el 25,3% son por relaciones heterosexuales no protegidas y el 7,1% por relaciones homosexuales no protegidas entre hombres. El 1,6% presentan las prácticas de riesgo de homo/bisexualidad más consumo de drogas por vía parenteral. Todos los casos pediátricos son hijos de madres de riesgo (HMR). En el 3,1% de los casos diagnosticados no se tiene información suficiente para asignarlos a una categoría de transmisión (Figura 4).

Figura 4.- Distribución de los casos de Sida según la vía de transmisión y el año de diagnóstico. La Rioja 1986-2013



La razón global de casos de Sida hombres/mujeres es de 3,9.

La distribución de los casos por categoría de transmisión difiere según el sexo. La razón hombres/mujeres con práctica de riesgo asociada a UDVP es de 4,5 mientras que la razón es de 2,6 en los casos atribuidos a la vía de transmisión heterosexual.


En el conjunto el periodo, la presentación de los casos por práctica de riesgo en varones, difiere por grupos de edad, así, el 61% de los casos de Sida asociados a transmisión por relaciones homomexuales y/o heterosexuales no protegidas se registran en los mayores de 40 años, frente al 12,8% de los mismos que presenta como vía de transmisión el ser UDVP. En los UDVP, el 87,2% de los casos tienen una edad inferior a 40 años.

Las infecciones oportunistas son el grupo de enfermedades indicativas de Sida más frecuentes, siendo la candidiasis esofágica con el 23,3% y la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* en el 22,8%, las infecciones más frecuentes. La tuberculosis es la enfermedad principal en el 32,2% de los casos y el síndrome caquético en el 11,4%.

Mortalidad en Sida

A pesar de que la supervivencia de los pacientes con Sida ha mejorado mucho tras la introducción de los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, ésta sigue siendo una enfermedad grave. La tasa de letalidad para el total de casos es del 62,9% (Figura 5). Los varones presentan una tasa de letalidad específica de 64,9% y las mujeres del 55,4%.


Figura 5.- Evolución de número de casos de Sida y fallecidos. Registro de Sida, La Rioja.1986-2013



Lugar de origen

En estos últimos años, el diagnóstico del Sida ha ido aumentando en las personas nacidas fuera de España y residentes en La Rioja en el momento del diagnóstico. Esta cifra ha variado considerablemente, ya que durante los primeros años de la epidemia este porcentaje era muy bajo. En el año 1999 fue del 12% y fue ascendiendo hasta el año 2013 con 33% de los casos. El mayor porcentaje se registró en el año 2008 con el 63,6% de los casos. Para el conjunto del periodo, los nacidos en España representan un 91,3% del total de casos, le siguen Latinoamérica, Europa Occidental y África subsahariana con el 3,1%, 2,7% y 2,4% respectivamente cada una de las zonas (Figura 6).

Figura 6.- Distribución de los casos de Sida por lugar de origen. La Rioja, 1986-2013.



Nuevos diagnósticos de Sida en el año 2013

En el año 2013 se han notificado un total de 9 casos incidentes de Sida, con una tasa de 2,8 casos nuevos por 100.000 habitantes, manteniendo la tendencia descendente registrada en La Rioja a partir del año 1994.

Todos han sido diagnósticos tardíos (CD4 inferiores a 350 células/ μ l)³ y de ellos en 6 casos se ha diagnosticado simultáneamente VIH y Sida.

Siete de los casos han sido en varones y dos mujeres. Por edad, siete casos tienen una edad comprendida entre 40 y 54 años y dos tienen una edad igual o mayor de 60 años. La mediana de edad al diagnóstico es de 49 años y la media de 50,3 años.

En el 33,3% la categoría de transmisión corresponde a personas que contrajeron la infección por relaciones sexuales no protegidas (1 caso heterosexual y 2 casos homosexuales), un 33,3% por ser usuario de drogas por vía parenteral y en el 33,3% restante no se conoce el riesgo.

El 66,7% (6/9 casos) consta país de origen España. El 22,2% (2 casos) proceden de América latina y 11,1% (1 caso) de África subsahariana.

La tuberculosis pulmonar ha sido la enfermedad indicativa de Sida más frecuente (33,3%) seguida de la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* con el 22,2% de los casos (Tabla 1).

Tabla 1.- Casos de Sida por enfermedades indicativas*. La Rioja año 2013


Enfermedades	Hombres (n=7)		Mujeres (n=2)		Total (n=9)	
	casos	%	casos	%	casos	%
Candidiasis esofágica			1	50	1	11,1
Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar	1	14,3			1	11,1
Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i>	2	28,6			2	22,2
Toxoplasmosis cerebral	1	14,3			1	11,1
Tuberculosis extrapulmonar o diseminada			1	50	1	11,1
Linfoma no-Hodkin	1	14,3			1	11,1
Síndrome caquético por VIH	1	14,3			1	11,1
Tuberculosis pulmonar	3	42,9			3	33,3
Neumonía bacteriana recurrente	1	14,3			1	11,1

*La suma de los porcentajes puede exceder del 100% porque un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa.

Prevalencia de infección de VIH en La Rioja

Desde el año 1984 hasta el 31 de diciembre de 2013 se han registrado en La Rioja un total de 1737 nuevas infecciones. En la figura 7 se muestra la evolución de la incidencia de VIH, en la que se ve que ha habido tres cambios significativos de la tendencia, el primer cambio va desde 1984 hasta 1991 en el que las tasas crecían con un promedio anual del 17% anual; un segundo cambio desde 1991 hasta 1995 con un decremento anual del 24,2% y un tercer periodo a partir de 1995 hasta el 2013 donde las tasas disminuyen un promedio anual del 7,3%. Los tres cambios son estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Figura.7- Tendencia y distribución temporal de tasas de VIH por año de diagnóstico. La Rioja 1984-2013




El 71,3% de los diagnósticos han correspondido a hombres. El grupo de edad con mayor número de casos es el de 25 a 29 años (28,4%) seguido del de 20 a 24 años con un 19,2%. El grupo de edad de 30 a 39 años representa el 28,8% del total de casos. Los casos en personas mayores de 50 años suponen el 9,8% del total de diagnosticados.

La categoría de transmisión más frecuente ha sido la UDVP con un 58,3%, el 24,5% de los casos corresponden a transmisión heterosexual y el 3,8% a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH). El 1,7% de los casos son debidos a transfusiones de sangre y hemoderivados, a ser hijos de madres de riesgo y a otras prácticas de riesgo. En el 11,2% de los casos no se identificó la práctica de riesgo.

El número y porcentaje de diagnósticos anuales en UDVP ha disminuido marcadamente desde finales de los años 80, mientras que el número y porcentaje de diagnósticos de infección atribuidos a relaciones sexuales no protegidas ha aumentado de forma sistemática. El porcentaje atribuido a relaciones heterosexuales supera a partir del año 2001 al porcentaje atribuido a los UDVP (Figura 8).

La evolución de la incidencia de VIH según la categoría de transmisión en el periodo 1984-1990, muestra que en los UDVP las tasas aumentaron un promedio anual del 15%, de 1990 a 2013 descendieron un promedio anual del 17,5% (ambos cambios estadísticamente significativos ($p < 0,05$)). En aquellos casos cuya categoría de transmisión es la vía heterosexual sin protección, el promedio de crecimiento anual desde 1984 a 1991 es del 42,1% ($p < 0,05$), y de 1991 a 2013 desciende un promedio anual del 0,8%, no siendo este estadísticamente significativo. Los casos con categoría de transmisión homosexual sin protección el porcentaje de ascenso anual en el periodo ha sido del 2,9%, no siendo estadísticamente significativo.

Figura 8.- Distribución de porcentaje y casos de Infección por VIH según la vía de transmisión y el año diagnóstico. La Rioja 1984-2013



Zona geográfica de origen:

En la figura 9 se muestra la distribución de nuevos casos de infección VIH según el lugar de origen diagnosticados en La Rioja en el periodo 1984 a 2013. Se observa un aumento en el porcentaje de casos nacidos fuera de España a partir del año 1997 hasta el año 2008 momento en el que dicho porcentaje comienza a descender. Durante el año 2008 se registró el mayor porcentaje con un 60% de los casos. El mayor número de casos para este período se registra en las personas procedentes de África subsahariana, seguido de Latinoamérica y de los países de Europa Occidental.

La evolución de la incidencia de VIH según el lugar de origen durante el periodo 1996-2013, muestra que en los nacidos en España las tasas han descendido un promedio anual del 9,4% mientras que en los nacidos fuera de España el promedio de descenso anual ha sido del 14,4%, ambos descensos son estadísticamente significativos ($p < 0,05$).


En la tabla 2 se muestran las tasas por 100.000 habitantes para la población nacida en España y para la población nacida fuera de España, en el periodo 1996-2013. El 31,9% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH se realizó en mujeres, y de estas el 41,3% fueron mujeres nacidas fuera de España.

Tabla 2.- Distribución de las tasas* de VIH por lugar de origen y sexo. La Rioja, 1996-2013

Años	Varones		Mujeres		Ambos sexos	
	España	nacidos fuera de España	España	nacidos fuera de España	España	nacidos fuera de España
1996	26,3	0,0	10,6	0,0	18,4	0,0
1997	20,1	0,0	10,6	0,0	15,3	0,0
1998	31,9	91,2	10,7	97,5	21,2	94,3
1999	19,4	118,5	11,4	88,3	15,4	104,3
2000	25,8	154,7	5,4	73,6	15,5	117,7
2001	13,2	69,4	3,0	89,3	8,1	78,1
2002	11,5	80,0	3,7	13,6	7,6	51,9
2003	13,0	61,9	6,0	61,9	9,4	61,9
2004	6,8	52,4	2,2	76,8	4,5	63,0
2005	8,3	47,6	1,5	71,0	4,8	57,6
2006	8,2	19,0	2,9	56,7	5,6	35,2
2007	6,7	32,1	2,9	35,5	4,8	33,6
2008	4,5	19,5	1,5	34,6	2,9	26,1
2009	5,2	14,8	2,2	32,1	3,7	22,5
2010	11,1	22,7	2,2	13,3	6,6	18,4
2011	5,1	20,4	2,1	18,3	3,6	19,4
2012	5,9	17,5	0,7	4,5	3,3	11,1
2013	12,5	14,6	1,5	14,3	7,0	14,5

* Tasas por 100.000 de habitantes.

Figura 9.- Distribución de porcentaje y casos de VIH por lugar de origen. La Rioja, 1984-2013.



Nuevos diagnósticos de VIH en el año 2013

En el año 2013 se han notificado un total de 25 casos nuevos de infección por VIH. De ellos un 80% corresponden a hombres. La razón de masculinidad es de 4 (20/5). La edad media al diagnóstico de VIH para ambos sexos es de 41 años, siendo superior para los hombres (43 años) que para las mujeres (33 años). El 60% de los casos tienen edades comprendidas entre 30 y 50 años. Durante el año 2013 la transmisión del VIH es mayoritariamente por vía sexual, aproximadamente el 92% de los casos (23 casos) ha sido por mantener relaciones sexuales no protegidas, de los cuales un 72% son por transmisión heterosexual y un 20% homosexual. En el 8% de los casos la vía de transmisión ha sido ser UDVP. El 100% de los nuevos diagnósticos de VIH en el año 2013 disponían de una determinación de linfocitos CD4 en el momento del diagnóstico.

Un 48% (12 casos) de los nuevos diagnósticos han sido diagnóstico tardío y de éstos, 5 casos fueron diagnóstico simultáneo de VIH y Sida. Atendiendo al país de origen, tenemos que un 24% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH se realizaron en personas originarias de otros países, siendo: 2 de África subsahariana (Guinea Ecuatorial y Ghana); 2 de Latinoamérica (Bolivia y Colombia); y 1 de Europa Occidental (Portugal). y 1 de África del norte (Marruecos).

En el caso de las mujeres el 60% de los nuevos diagnósticos (3 casos) han sido en nacidas fuera de España: 2 de Latinoamérica (Bolivia y Colombia) y 1 de África subsahariana (Guinea Ecuatorial), que adquirieron la infección por transmisión heterosexual.

CONCLUSIONES

La incidencia de Sida en La Rioja creció un promedio anual del 26,6% desde el año 1986 a 1994 momento en el que registro la máxima incidencia (19,7 casos por 100.000 habitantes). A partir de ese momento y hasta 2013 se registró un cambio en la tendencia con un promedio de descenso anual del 11,9%. Esta reducción de los casos se debió mayoritariamente al efecto de los nuevos tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, aplicados a los infectados por VIH antes de que presenten criterios de diagnóstico de Sida. La razón de masculinidad para el periodo es del 3,9.

En el momento del diagnóstico de Sida un 49,4% de los casos tiene una edad comprendida entre 30 y 39 años, el 25,7% entre 20 y 29 años lo que indica que en el 75% de los casos la edad al diagnóstico está comprendida entre los 20 y 39 años, conforme aumenta la edad el porcentaje de casos de Sida disminuye, al igual que los pediátricos que suponen el 1,6% de los casos. A partir del año 2005 (a excepción del año 2009 y 2011) el porcentaje de casos de Sida cuya edad al diagnóstico era mayor de 49 años supera el 50%, siendo del 75% y 100% en los años 2012 y 2013 respectivamente. El aumento de la edad en los casos de Sida pone de manifiesto que las personas mayores adquieren la enfermedad por la vía sexual y que además los avances en el tratamiento han conseguido retrasar la aparición de las enfermedades oportunistas.

El porcentaje de diagnósticos en las personas cuya vía de transmisión es ser UDVP ha disminuido a lo largo del periodo. Sin embargo el porcentaje de Sida atribuido a relaciones heterosexuales no protegidas, presenta una tendencia creciente que ya supera al primer grupo tradicional. Los casos de Sida por transmisión perinatal se han eliminado prácticamente a partir del año 1994 tras la recomendación de tratar con antirretrovirales a las embarazadas seropositivas⁴⁻⁵. El porcentaje de casos con Sida en las personas nacidas fuera de España aumentó desde el año 1997 hasta el año 2008, coincidiendo este periodo con un incremento de población residente en La Rioja procedente de países de alta endemia. El hecho de que haya habido un aumento porcentual de casos de diagnóstico tardío hace que haya un aumento de la letalidad ligado a este retraso.

Al hablar de casos de Sida nos referimos a una consecuencia tardía de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), por tanto, el descenso de casos, no refleja necesariamente que la incidencia actual de nuevas infecciones haya disminuido.

La incidencia de VIH en La Rioja continúa con el descenso que inició en el año 1990, debido fundamentalmente al descenso de casos cuya categoría de transmisión es ser UDVP. En el caso de la transmisión sexual se observa una ligera tendencia al aumento en los homosexuales y un aumento porcentual de los casos ligados a transmisión heterosexual. El aumento de la edad al diagnóstico y el aumento de los casos en mujeres, son características que están relacionadas con la transmisión heterosexual.

BIBLIOGRAFÍA

- (1) Instituto de Salud Carlos III. Vigilancia epidemiológica del VIH/Sida en España. Actualización a 30 de junio de 2013. Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH. Registro Nacional de casos de Sida [Internet]. 2013. Recuperado a partir de: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/Sida/vigilancia/InformeVIH_Sida_Junio2013.pdf
- (2) Decisión de ejecución de la Comisión de 8 de agosto de 2012 que modifica la Decisión 2002/253/CE, por la que se establecen las definiciones de los casos para comunicar las enfermedades transmisibles a la red comunitaria de conformidad con la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2012) 5538] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2012/506/UE). D Of Unión Eur [Internet]. 2012 [citado 7 de agosto de 2014]; Recuperado a partir de: <http://www.boe.es/doue/2012/262/L00001-00057.pdf>
- (3) Área de vigilancia de VIH y conductas de riesgo. Diagnóstico tardío de la infección por VIH: Situación en España. Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida/Centro Nacional de Epidemiología. Madrid; 2011.
- (4) Ramos Amador JT, Contreras JR, Bastero R, Barrio C, Moreno P, Delgado R, et al. Estimate of HIV-1 infection prevalence in pregnant women and effectiveness of zidovudine administered during pregnancy in the prevention of vertical transmission. Med Clínica. 4 de marzo de 2000;114(8):286-91.
- (5) Iribarren, JA JA, Ramos, JT, Guerra L, Coll O, de José MI, Domingo P, et al. Prevención de la transmisión vertical y tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en la mujer embarazada. Enfermedades Infecc Microbiol Clínica [Internet]. agosto de 2001 [citado 12 de noviembre de 2014];19(07). Recuperado a partir de: <http://zl.elsevier.es/es/revista/enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28/prevencion-transmission-vertical-tratamiento-infeccion-virus-inmunodeficiencia-13018492-documento-consenso-2001>

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Durante el mes de septiembre de 2014 (semanas epidemiológicas 36 a 39) se ha notificado un caso aislado de legionelosis, en una mujer de 85 años, cuya evolución clínica ha sido favorable.

Se ha notificado un brote de tosferina familia con tres afectados. El primer caso declarado es una niña de 57 días no vacunada. En el estudio de contactos se detectan dos casos PCR positivo (padres de la niña).

También se declara caso de tosferina en una niña de 11 meses correctamente vacunada con 3 dosis.

Se ha notificado un caso de paludismo importado de Mali en un varón de 39 años, causado por *Plasmodium falciparum*.

Se han detectado dos brotes de intoxicación alimentaria cuyo agente causal ha sido *Salmonella enteritidis*. Se trata de un brote comunitario que afecta a siete personas, y otro familiar con cuatro afectados.

COMENTARIO EPIDEMIOLÓGICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

Durante el mes de octubre de 2014 (semanas epidemiológicas 40 a 44) se ha notificado un brote de legionelosis, que ha afectado a dos vecinos varones de 83 y 87 años, cuya evolución clínica ha sido favorable. Se ha detectado *Legionella pneumophila* en las instalaciones de agua caliente sanitaria del edificio.

Se han declarado siete casos de tos ferina, seis de ellos confirmados mediante PCR y un caso sospechoso. Los casos confirmados corresponden a dos brotes familiares de tosferina, cada uno con tres afectados. En el primero se trata de un varón menor de 2 meses, por lo que no estaba vacunado contra la tos ferina, y que requirió ingreso hospitalario. En el estudio de contactos se detectaron los casos de su madre (30 años) y su abuela (53 años), no vacunadas. El segundo brote afecta a dos hermanos varones de 4 y 7 años, correctamente vacunados con 4 y 5 dosis, respectivamente, y a su padre de 38 años no vacunado. El caso sospechoso es un caso aislado de una mujer de 38 años.

Se ha detectado un brote comunitario de enfermedad transmitida por alimentos con siete personas afectadas, cuyo agente causal ha sido *Salmonella enteritidis*.

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – ENERO- VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		0/00	0,01										0,08		0,10						
II	TUMORES	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	9	3	2	6	11
		0/00	0,26											0,42	0,29	0,23	1,19	0,53	0,36	1,35	3,20
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		0/00	0,01																		0,23
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
		0/00	0,02														0,13		0,18		
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		0/00	0,02																		0,23
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3
		0/00	0,06												0,10		0,13			0,90	0,87
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	10	22
		0/00	0,26										0,08		0,10		0,13	0,53	0,54	2,25	6,40
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	10
		0/00	0,14													0,12	0,13	0,35	0,54	1,35	2,91
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2
		0/00	0,04										0,16			0,12		0,18			0,58
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		0/00	0,02															0,18			
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		0/00	0,03																0,18	0,23	0,87
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-
		0/00	0,05								0,07	0,15						0,35		0,68	
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL VARONES		Nº	147	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	6	4	13	12	10	32	58
		0/00	0,92								0,07	0,15	0,32	0,42	0,59	0,46	1,72	2,13	1,81	7,20	16,87

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 –ENERO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		
II	TUMORES	Nº	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	2	2	5	5	10
		0/00	0,19								0,08			0,26	0,20	0,12	0,25	0,32	0,72	0,79	1,46
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		0/00	0,01																		
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
		0/00	0,07																		
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8
		0/00	0,07																0,29	0,16	1,16
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	36
		0/00	0,31																0,72	1,42	5,24
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	11
		0/00	0,11											0,09		0,12		0,16	0,29	0,32	1,60
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		0/00	0,02															0,16		0,16	0,29
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		0/00	0,02																	0,16	0,29
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		0/00	0,04																0,14	0,16	0,58
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0/00	0,01																0,14		
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01																		
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		0/00	0,02																	0,32	0,15
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
TOTAL MUJERES		Nº	144	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	2	4	16	22	91
		0/00	0,89								0,08			0,35	0,20	0,24	0,25	0,65	2,29	3,48	13,24

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – ENERO– AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,01										0,04		0,05						0,10
II	TUMORES	Nº	72	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	5	3	11	5	7	11	21
		0/00	0,22								0,04			0,34	0,25	0,17	0,71	0,42	0,56	1,02	2,04
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		0/00	0,01																	0,09	0,10
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
		0/00	0,02														0,06		0,08		0,39
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
		0/00	0,05																	0,09	1,36
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	11
		0/00	0,06												0,05		0,06		0,16	0,46	1,07
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	8	19	58
		0/00	0,28										0,04		0,05		0,06	0,25	0,64	1,77	5,63
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	5	8	21
		0/00	0,13											0,04		0,12	0,06	0,25	0,40	0,74	2,04
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	1	4
		0/00	0,03										0,08			0,06		0,17		0,09	0,39
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
		0/00	0,02															0,08		0,09	0,49
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
		0/00	0,03																0,16	0,19	0,68
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		0/00	0,00																0,08		
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		0/00	0,00																		0,10
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	5	1
		0/00	0,03								0,04	0,08						0,17		0,46	0,10
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0/00																			
	TOTAL GENERAL	Nº	291	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	8	6	15	16	26	54	149
		0/00	0,90								0,07	0,08	0,16	0,39	0,40	0,35	0,96	1,35	2,08	5,02	14,45

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – FEBRERO – VARONES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	47 0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	4 0,34	7 0,69	3 0,35	5 0,66	7 1,24	4 0,73	11 2,48	5 1,45
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	1 0,29
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	2 0,45	3 0,87
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	1 0,12	-	-	-	-	4 1,16
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	31 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	-	2 0,23	1 0,13	1 0,18	3 0,54	7 1,58	16 4,65
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	15 0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,54	6 1,35	6 1,75
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	7 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,13	-	1 0,18	4 0,90	1 0,29
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,18	-	1 0,29
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	-	-	1 0,10	-	2 0,26	-	-	1 0,23	1 0,29
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARONES			Nº 0/00	122 0,76	-	-	-	-	-	-	-	1 0,07	2 0,16	5 0,42	8 0,79	6 0,69	9 1,19	8 1,42	14 2,54	31 6,98	38 11,05

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – FEBRERO – MUJERES

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	21 0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,16	-	1 0,09	-	2 0,24	1 0,12	1 0,16	1 0,14	5 0,79	8 1,16
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	5 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	4 0,58
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	4 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 0,58
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	6 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10	-	-	1 0,16	1 0,14	2 0,32	1 0,15
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	31 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,25	-	1 0,14	4 0,63	24 3,49
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	13 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	-	1 0,16	11 1,60
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,12	-	-	-	-	2 0,29
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,16	1 0,15
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	3 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 0,44
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,15
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	10 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	1 0,09	-	-	-	1 0,16	-	2 0,32	5 0,73
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MUJERES			Nº 0/00	100 0,62	-	-	-	-	-	-	-	2 0,16	1 0,08	2 0,17	1 0,10	3 0,35	3 0,37	4 0,65	3 0,43	16 2,53	65 9,46

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

DEFUNCIONES EN LA RIOJA* - SEGÚN GRUPO DE CAUSA, SEXO Y EDAD - AÑO 2014 – FEBRERO – AMBOS SEXOS

(Grandes Grupos de Enfermedades según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE 10), cifras absolutas y tasas específicas por mil habitantes)

CAUSA DEFUNCIÓN			TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y+
I	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TUMORES	Nº 0/00	68 0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0,08	1 0,04	5 0,21	7 0,35	5 0,29	6 0,38	8 0,68	5 0,40	16 1,49	13 1,26
III	ENF.SANGRE Y ORGAN.HEMATOPOYETICOS Y TRS.MEC.INMUNIDAD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	ENF.ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICAS	Nº 0/00	7 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	1 0,09	5 0,49
V	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Nº 0/00	10 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	2 0,19	7 0,68
VI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Nº 0/00	12 0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	1 0,05	1 0,06	-	1 0,08	1 0,08	2 0,19	5 0,49
VII	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ENFERMEDADES DEL OIDO Y APOFISIS MASTOIDES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Nº 0/00	62 0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	-	-	2 0,12	3 0,19	1 0,08	4 0,32	11 1,02	40 3,88
X	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Nº 0/00	28 0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	3 0,24	7 0,65	17 1,65
XI	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Nº 0/00	10 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,06	1 0,06	-	1 0,08	4 0,37	3 0,29
XII	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10
XIII	ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ.CONJUNTIVO	Nº 0/00	2 0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,09	1 0,10
XIV	ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	Nº 0/00	5 0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,08	-	4 0,39
XV	EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS PERIODO PERINATAL	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	MALFORMAC.CONGENITAS,DEFORMIDADES Y ANOMAL.CROMOSOMICAS	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	SINT,SIG Y HALLAZ ANOR CLI Y DE LAB, NO CLAS OTRA PARTE	Nº 0/00	1 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,10
XX	CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD	Nº 0/00	16 0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0,04	1 0,04	1 0,04	1 0,05	-	2 0,13	1 0,08	-	3 0,28	6 0,58
XXI	FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTOS SERV.SALUD	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES	Nº 0/00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			Nº 0/00	222 0,69	-	-	-	-	-	-	-	3 0,12	3 0,12	7 0,30	9 0,45	9 0,52	12 0,77	12 1,02	17 1,36	47 4,37	103 9,99

NOTA: El Capítulo XIX "Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas" no se utiliza como causa básica de defunción y se identifican en el Capítulo XX las causas externas de las afecciones clasificadas en el Capítulo XIX

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2014. SEMANAS 36 a 39

	Semana 36				Semana 37				Semana 38				Semana 39			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	0	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
ENF.TRANS. ALIMENTOS	6	77	1,5	1,24	7	84	0,7	1,33	4	88	0,57	1,26	2	90	0,5	1,25
EQUINOCOCOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
GRIPE	0	4591	0	1,68	2	4593	0,08	1,68	3	4596	0,12	1,68	1	4597	0,02	1,68
ENFERM. INVASORA POR H. INFLUENZAE	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1
HEPATITIS A	0	6	*	1,5	0	6	0	1,5	0	6	0	1,5	0	6	0	1,2
HEPATITIS B	0	3	0	1	0	3	*	1	0	3	*	1	0	3	*	1
HEPATITIS OTRAS	0	5	0	0,83	0	5	*	0,83	0	5	0	0,83	0	5	*	0,83
INF. GONOCÓCICA	0	10	0	0,63	0	10	0	0,63	1	11	*	0,69	0	11	0	0,65
IRA	1020	58158	1	1,11	1027	59185	0,74	1,1	1256	60441	0,88	1,1	1361	61802	0,85	1,1
LEGIONELOSIS	0	4	0	0,57	0	4	0	0,57	1	5	*	0,71	0	5	0	0,71
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	3	0	0,33	1	4	1	0,4	0	4	*	0,4	0	4	0	0,4
PAROTIDITIS INFE.	0	5	0	0,33	0	5	0	0,31	0	5	0	0,31	0	5	0	0,29
Proc.diarreicos, otros	221	7733	1,11	1,09	232	7965	0,9	1,08	329	8294	2,14	1,09	247	8541	0,93	1,09
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	16	0	1,45	0	16	0	1,45	0	16	*	1,45	0	16	*	1,45
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	3	25	*	1,92	1	26	1	1,86	0	26	0	1,73	0	26	0	1,73
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	6	*	0,67	0	6	0	0,67	0	6	0	0,67	0	6	*	0,67
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	19	0	0,54	1	20	0,33	0,57	0	20	0	0,57	0	20	0	0,56
VARICELA	9	1055	1,13	0,94	5	1060	1,25	0,94	1	1061	0,17	0,93	4	1065	0,5	0,93

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. AÑO 2014. SEMANAS 40 a 44

	Semana 40				Semana 41				Semana 42				Semana 43				Semana 44			
	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac	Casos	Cas. Ac	I.E.	I.E. Ac
BOTULISMO	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
BRUCELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
CARBUNCO	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
ENF. MENINGOCÓCICA	0	1	0	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
ENF.TRANS. ALIMENTOS	3	93	0,38	1,15	3	96	1	1,17	10	106	5	1,26	4	110	2	1,28	1	111	0,5	1,28
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5	0	1	*	0,5
GRIPE	9	4606	0,13	1,67	14	4620	0,14	1,67	12	4632	0,07	1,66	13	4645	0,03	1,47	17	4662	0,03	1,22
ENFERM. INVASORA POR H:INFLUENZAE	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1	0	2	*	1
HEPATITIS A	0	6	0	1,2	0	6	0	1	0	6	0	0,55	0	6	0	0,5	0	6	0	0,5
HEPATITIS B	0	3	*	1	0	3	*	1	0	3	*	1	0	3	*	1	0	3	*	1
HEPATITIS OTRAS	0	5	*	0,83	0	5	0	0,83	0	5	*	0,83	0	5	*	0,83	0	5	0	0,83
INF. GONOCÓCICA	1	12	1	0,71	0	12	0	0,71	0	12	0	0,71	0	12	0	0,67	0	12	0	0,63
IRA	1900	63702	1,13	1,1	2266	65968	1,24	1,11	2233	68201	1	1,11	2173	70374	0,94	1,11	1882	72256	1,18	1,12
LEGIONELOSIS	2	7	2	1	1	8	1	1	1	9	1	1,13	0	9	0	1	0	9	0	1
LEISHMANIASIS	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0
PALUDISMO	0	4	0	0,36	0	4	*	0,36	0	4	*	0,36	0	4	*	0,36	0	4	0	0,36
PAROTIDITIS INFECC.	0	5	*	0,29	0	5	0	0,28	0	5	0	0,28	0	5	*	0,28	0	5	0	0,28
Proc.diarreicos, otros	374	8915	1,28	1,08	395	9310	1,3	1,08	427	9737	1,06	1,07	406	10143	1,09	1,07	354	10497	1,39	1,07
RUBEOLA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SHIGELOSIS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
SÍFILIS	0	16	*	1,45	0	16	0	1,45	0	16	0	1,33	0	16	0	1,33	0	16	0	1,33
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TÉTANOS	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0
TOS FERINA	5	31	5	2,07	2	33	*	2,2	0	33	*	2,2	0	33	*	2,2	0	33	0	2,2
TRIQUINOSIS	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
TUBERCULOSIS OTRAS	0	6	0	0,6	1	7	*	0,7	0	7	*	0,7	0	7	0	0,7	0	7	0	0,7
TUBERCULOSIS RESPIR.	1	21	1	0,57	0	21	0	0,55	1	22	1	0,58	1	23	0,5	0,61	0	23	0	0,61
VARICELA	2	1067	0,33	0,92	11	1078	1,83	0,92	6	1084	0,6	0,92	10	1094	1	0,92	6	1100	0,55	0,92

I.E.: Índice Epidémico para una enfermedad es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24: se considera normal; si es menor o igual a 0,75: incidencia baja; si es mayor o igual a 1,25: incidencia alta. En enfermedades de baja incidencia este índice no es de utilidad, dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en dicho índice. * Operación no realizable por ser el denominador 0. Cas. Ac: casos acumulados hasta la semana. I.E. Ac: Índice epidémico acumulado. Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. SEPTIEMBRE 2014 (TASAS POR CIENT MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25444 H.	16427 H.	18383 H.	.6866 H.	34188 H.	1800 H.	665 H.	10917 H.	4442 H.	19989 H.	153066 H.	17447 H.	462 H.	11931 H.	322027
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	7,86	6,09	0	0	17,56	0	0	0	0	10	5,22	0	0	0	5,90
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	0	16,32	0	0	55,56	0	0	0	0	1,31	0	0	0	1,86
ENFERM. INVASORA POR H. INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
IRA	1.544,57	1.351,42	1.539,46	1.106,90	1.760,86	2.055,56	1.654,14	2.042,68	1.440,79	2.136,18	1.190,37	1.547,54	0	1.961,28	1448,33
LEGIONELOSIS	0	0	0	14,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	416,59	346,99	359,04	334,98	389,03	0	0	412,2	292,67	500,28	231,28	447,06	0	452,61	319,54
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	11,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	1,24
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0,31
VARICELA	7,86	0	0	29,12	11,7	0	0	18,32	0	10,01	3,91	0	0	8,38	5,90

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE EDO POR ZONAS DE SALUD. LA RIOJA. OCTUBRE 2014 (TASAS POR CIENTO MIL HABITANTES)

	ALBELDA- ALBERITE	ALFARO	ARNEDO	AUSEJO Y MURILLO	CALAHORRA	CAMEROS NUEVOS	CAMEROS VIEJOS	CENICERO- NAVARRETE	CERVERA RIO ALHAMA	HARO	LOGROÑO	NAJERA	SIETE VILLAS	STO. DOMINGO CALZADA	TOTAL
	25444 H.	16427 H.	18383 H.	.6866 H.	34188 H.	1800 H.	665 H.	10917 H.	4442 H.	19989 H.	153066 H.	17447 H.	462 H.	11931 H.	322027
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF.TRANS. ALIMENTOS	3,93	6,09	5,44	29,13	5,86	0	0	0	22,51	0	3,26	28,65	0	25,14	6,52
EQUINOCOCOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXANT. MEDIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. REC.GARRAPATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. TIFOIDEA Y PARATIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	35,37	12,18	32,64	0	11,71	111,12	0	54,96	22,51	20,01	17,62	17,19	0	8,38	20,18
ENFERM. INVASORA POR H. INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	9,16	0	0	0	0	0	0	0,31
IRA	3.116,65	2.514,14	3.432,52	2.330,32	2.831,41	1.722,23	1.353,40	4.314,36	2.949,12	3.987,20	3.290,72	2.934,60	0	4.199,14	3246,31
LEGIONELOSIS	0	6,09	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0	0	8,38	1,24
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENING. TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS INFE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc.diarreicos, otros	640,63	693,99	1.115,15	815,62	567,47	166,68	0	998,44	225,12	570,31	521,36	779,51	0	452,6	607,40
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIGELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS CONGÉNITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,56	0	0	0	2,17
TRIQUINOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS OTRAS	0	0	0	14,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31
TUBERCULOSIS RESPIR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	5,73	0	0	0,93
VARICELA	23,58	0	0	0	5,86	0	0	27,48	0	15	13,71	0	0	0	10,87

Fuente: Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria en La Rioja. Dirección General de Salud Pública y Consumo

Comité editorial: Enrique Ramalle Gómara, Eva Martínez Ochoa, Carmen Quiñones Rubio, Josefina Perucha González

Edita: Consejería de Salud y Servicios Sociales. Sección de Información Sanitaria.

Vara de Rey, 8 1ª planta. 26071 Logroño (La Rioja)

Envío gratuito. Solicitudes: Teléfono: 941 29 19 77.

Correo electrónico: eramalle@larioja.org
